

## **ALL.TO AL QUESTIONARIO LAVORATORI "FRAGILI" EMERGENZA COVID-19**

### **ELENCO PATOLOGIE**

Le patologie interessate sono quelle indicate nell'elenco seguente che vuole essere indicativo e non esaustivo. È fatta salva la valutazione clinica del rischio del singolo caso.

#### **⇒ Ipertensione arteriosa**

- Ipertensione arteriosa con danno agli organi bersaglio
- Ipertensione arteriosa resistente alla terapia

#### **⇒ Malattie cardiovascolari**

- Cardiopatie della classe funzionale NYHA  $\geq$  II e NT-pro BNP > 125 pg/ml
- Ictus cerebrale pregresso e/o vasculopatia sintomatica

##### **➤ Cardiopatie coronariche**

- Sindrome coronarica acuta negli ultimi 12 mesi
- Sindrome coronarica cronica sintomatica, nonostante la terapia farmacologica

##### **➤ Malattie delle valvole cardiache**

- Stenosi della valvola nativa e/o rigurgito valvolare, se associate a cardiopatie della classe funzionale NYHA  $\geq$  II o a rischio cardiovascolare  $\geq$  2 (di cui uno è il diabete o l'ipertensione arteriosa) o ad ictus cerebrale pregresso e/o vasculopatia sintomatica o ad insufficienza renale cronica (stadio 3, GFR <60ml/min)
- Stenosi da moderata a severa o severa e/o rigurgito valvolare

##### **➤ Insufficienza cardiaca**

- Cardiopatie della classe funzionale NYHA  $\geq$  II o NT-pro BNP > 125pg/ml,
- Cardiomiopatie di tutte le eziologie
- Ipertensione arteriosa polmonare

##### **➤ Aritmie Cardiache**

- Tutte le forme di aritmia cardiaca, se associate a cardiopatie della classe funzionale NYHA  $\geq$  II o a rischio cardiovascolare  $\geq$  2 (di cui uno è il diabete o l'ipertensione arteriosa) o ad ictus cerebrale pregresso e/o vasculopatia sintomatica o ad insufficienza renale cronica (stadio 3, GFR <60ml/min)
- Fibrillazione atriale
- Precedente impianto di un pacemaker cardiaco, se associato a cardiopatie della classe funzionale NYHA  $\geq$  II o a rischio cardiovascolare  $\geq$  2 (di cui uno è il diabete o l'ipertensione arteriosa) o ad ictus cerebrale pregresso e/o vasculopatia sintomatica o ad insufficienza renale cronica (stadio 3, GFR <60ml/min)
- Precedente cardioablazione, se associata a cardiopatie della classe funzionale NYHA  $\geq$  II o a rischio cardiovascolare  $\geq$  2 (di cui uno è il diabete o l'ipertensione

arteriosa) o ad ictus cerebrale pregresso e/o vasculopatia sintomatica o ad insufficienza renale cronica (stadio 3, GFR <60ml/min)

⇒ **Malattie croniche delle vie respiratorie**

- Malattie polmonari ostruttive croniche moderate o gravi (stadio GOLD II-IV)
- Enfisema polmonare
- Forme di asma bronchiale particolarmente severe e non controllate
- Malattie polmonari interstiziali
- Cancro attivo ai polmoni
- Ipertensione arteriosa polmonare
- Malattia vascolare polmonare
- Sarcoidosi attiva
- Fibrosi cistica
- Apnea del sonno in concomitanza con altri fattori di rischio

⇒ **Insufficienza renale cronica**

- Insufficienza renale cronica, da moderata a grave

⇒ **Diabete**

- Diabete mellito, con complicanze croniche cardiovascolari o con un valore di HbA1c >9 %

⇒ **Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario**

- Immunodepressione severa
- Assunzione di medicinali che sopprimono la risposta immunitaria (p. es. assunzione prolungata di glucocorticoidi, anticorpi monoclonali, citostatici ecc.)
- Linfomi
- Leucemie
- Anemie (forme gravi)
- Mieloma multiplo

⇒ **Neoplasie**

- Malattie tumorali in corso di trattamento medico